



Indikation: Entzündliche Erkrankungen

Studienname und Titel	Kurzbeschreibung für Patienten	Studienarzt & Studienkoordination	Start am Zentrum
<p>TOASST Studie: Cortisolbehandlung ausschleichen oder direkt stoppen?</p>	<p>Die Studie soll die Hypothese prüfen, dass auch nach längerer Behandlungsdauer mit Prednison®, Spiricort® oder einem verwandten Produkt auf ein langsames Ausschleichen der Dosis verzichtet werden darf, ohne dass dadurch ein schlechterer Verlauf resultiert. So könnten eine unnötige Verlängerung der Behandlung und allfällige unerwünschte Nebeneffekte vermieden werden.</p>	<p>PD. Dr. med. Kistler Andreas Email: andreas.kistler@stgag.ch B. Luther Email: birgit.luther@stgag.ch</p> <p>Prof. Dr. Robert Thurnheer Email: robert.thurnheer@stgag.ch S. Bucher Email: susanne.bucher@stgag.ch</p>	<p>KSF 2021</p> <p>KSM 2021</p>

Studienergebnisse

Studienergebnisse beendeter Studien können auf www.clinicaltrials.gov oder www.kofam.ch/en/snctp-portal/ nachgelesen werden.